



N°I. 477.669.372
M♥NS

Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrelîer 21 B-7050 Masnuy-St-Jean

www.closdelolivier.be

mail@closdelolivier.be

Tél.: 065/235975

Banque CA BE17 1030 2051 0821



Service public de Wallonie

Le Centre accueille fréquemment des Mouettes rieuses. Cet oiseau aquatique fréquente les lacs et étangs où elle ne trouve pas de vastes roselières, les marais et les étangs côtiers. On la trouve également en ville et dans les zones cultivées.

L'histoire raconte que la mouette à été observée pour la première fois à Bruxelles au Parc Duden pendant la deuxième guerre mondiale suite aux bombardements le long de la côte belge.

Nous nous permettons de la présenter sur notre site ! Bonne lecture.

LA MOUETTE RIEUSE

CHROICOCEPHALUS RIDIBUNDUS, LARUS RIDIBUNDUS



La mouette rieuse est un élégant oiseau aquatique et les deux sexes sont identiques.

L'adulte en plumage nuptial a le dos et le dessus des ailes gris clair. Les primaires externes sont blanches avec les extrémités noires. Le bord d'attaque est d'un blanc pur, mais il devient noir vers les primaires les plus externes. Le dessous des primaires est sombre.

La mouette rieuse a un capuchon brun-chocolat qui s'étend jusqu'à l'arrière de la partie auriculaire, et des croissants blancs autour de l'œil.

Les parties inférieures sont blanches, parfois teintées de rose sur la poitrine au printemps.

La queue est blanche.

Le bec, les pattes et les doigts sont rouge noirâtre.

Les yeux sont foncés.

L'adulte en plumage d'hiver a des taches sombres nettes en arrière des yeux. Le capuchon sombre disparaît après la saison nuptiale. On peut voir deux barres noires indistinctes en travers de la calotte.

Le bec est rouge avec l'extrémité noire. Les pattes et les doigts sont rouges.

Le juvénile et l'immature (Oiseau n'ayant plus les caractères du juvénile, mais qui n'est pas encore capable de se reproduire.) n'a pas de capuchon noir.

CHANT :

Le cri typique de la mouette rieuse est rauque. Ce sont des oiseaux très bruyants et des cris courts peuvent être entendus dans les colonies, et lors des querelles.

La mouette rieuse émet de longs glapissements et des sortes de jappements courts et répétés.

HABITAT :

La mouette rieuse se reproduit aux lisières des marais, des étangs et des lacs, et dans les clairières dans les régions de forêt boréale.

Elle hiverne dans des habitats côtiers variés, depuis les eaux côtières jusqu'aux ports, les marais salants et les estuaires. On peut la trouver en ville, dans les parcs urbains avec de l'eau.

VOL :

La mouette rieuse effectue un vol rapide et actif. Elle peut planer et glisser, et même capturer des insectes en vol.

NIDIFICATION :

La mouette rieuse nidifie en grandes colonies, jusqu'à 1000 couples ou plus. Les nids sont à environ un à cinq mètres les uns des autres.

C'est un nid assez grand sur le sol ou dans la végétation basse et humide. C'est une dépression peu profonde tapissée de végétation.

La femelle dépose 2 à 3 œufs brun-olive, mouchetés de brun, vers fin avril-début mai. L'incubation dure environ 22 à 26 jours. Les jeunes restent au nid environ une semaine et sont semi-nidicoles. Ils quittent vraiment le nid vers l'âge de 32 à 35 jours.

RÉGIME :

C'est une espèce omnivore. La mouette rieuse se nourrit surtout d'insectes aquatiques et terrestres, d'invertébrés marins, de poissons, de vers de terre. Elle consomme aussi des fruits, des graines, des débris variés et parfois des souris.

PROTECTION / MENACES :

Les populations de mouettes rieuses s'étendent autour du monde, colonisant petit à petit d'autres pays, depuis les latitudes moyennes en Europe et en Asie, jusqu'aux zones subarctiques.