



# Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE  
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrelrier 21 - B-7050 Masnuy-St-Jean  
[www.closdelolivier.be](http://www.closdelolivier.be) - [mail@closdelolivier.be](mailto:mail@closdelolivier.be)

Tél.: 065/235975 - Gsm: 0475/67.55.37

BE17 1030 2051 0821 BIC NICABEBB

## BONDRÉE APIVORE



**FAMILLE** : Accipitridés.

**REPARTITION GEOGRAPHIQUE** : La bondrée apivore est un migrateur, il est commun à toute l'Europe sur les régions boisées et en moyenne montagne à partir de Avril - Mai. Il Hiverné dans la région du Sahel. En Wallonie, essentiellement au sud du sillon Sambre – Meuse, quelques couples sont visibles en Hainaut et Brabant.

**DESCRIPTION** : Assez semblable à la buse variable, La queue est assez longue avec deux barres à la base et une barre terminale, elle est plus fine que la buse, sa tête est plus massive et le vol est moins souple, plus planant.

**LONGEVITE** : 28 ans.

**HABITAT** : bois des feuillus et de pins, zones peut utilisées par l'homme, plaines avec bosquets, toutes zones où il y a présence d'hyménoptères. Le territoire vital couvre 5000 hectares

**REPRODUCTION** : Les animaux sont monogames. Le nid est souvent celui d'un corvidé. La couvaison (2 œufs) par les deux parents dure 35 jours. L'envol des jeunes se produit après 40 à 45 jours,

**ALIMENTATION** : essentiellement insectivore, elle manges des bourdons, des guêpes, des abeilles (hyménoptères)...., elle mange aussi des œufs, des oiseaux et des rongeurs.

**PREDATEUR** : essentiellement l'homme, l'utilisation de pesticide, le braconnage, la déforestation...

**DIVERS** : Il y aurait 200 à 300 couples en région wallonnes