

1998-2013



15 ANS!

Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrelrier 21 - B-7050 Masnuy-St-Jean

www.closdelolivier.be - mail@closdelolivier.be

Tél.: 065/235975 - Gsm: 0475/67.55.37

BE17 1030 2051 0821 BIC NICABEBB

CHOUETTE CHEVÊCHE



FAMILLE : Strigidés.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE : Toute l'Europe. Toutes les régions du pays.

DESCRIPTION : Rapace Nocturne d'une taille de 20 cm pour un poids de 200 grammes. Elle est petite. Elle a le front aplati et un v de couleurs blanche en travers de la nuque. Les sourcils et la gorge sont blancs. Les pattes sont couvertes de petites plumes blanches.

LONGEVITE : L'espérance de vie maximale est de 9 ans et demi.

HABITAT : elle préfère les prairies parsemées de haies et de bosquets, de vergers, de bâtiments agricoles lui permettant la chasse, elle évite les bois et ne se rencontre pas en grande forêt.

REPRODUCTION : Le nid est construit dans le creux d'un tronc ou dans un nid artificiel, la ponte comprend 3 à 5 œufs et se déroule de mi avril à mi mai. La couvaison dure 28 jours. Les jeunes sont sevrés et s'envolent après un mois.

ALIMENTATION : tout animal capturable avec lequel elle peut s'envoler, elle s'adapte très bien à la faune locale : rongeurs, petits oiseaux (notamment des hirondelles), grenouilles, gros insectes.

PREDATEUR : L'un des rares prédateurs naturel n'est autre que la chouette hulotte, le renard peut aussi prendre quelques spécimen, les mustélidés peuvent s'attaquer aux couvées. Le prédateur principal est l'homme par l'ensemble de ses activités, notamment la disparition des haies et bosquet pour cause d'agriculture extensive mais aussi les dégâts dus aux véhicules ou encore l'utilisation de pesticides.

DIVERS : Les printemps pluvieux ont des effets néfastes sur les nichées de Chevêche. L'humidité ambiante transforme l'intérieur des cavités ce qui entrave le développement normal des poussins. La Chouette chevêche est également sensible aux hivers rudes surtout lors d'enneigements prolongés qui entravent la capture des proies. Enfin la chevêche est sujette à un endoparasitisme exacerbé par son régime alimentaire. La moindre chute d'immunité entraîne un déséquilibre hôte - parasite qui conduit souvent à de la mortalité.