

1998-2013



15 ANS!

# Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE  
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrellet 21 - B-7050 Masnuy-St-Jean

www.closdelolivier.be - mail@closdelolivier.be

Tél.: 065/235975 - Gsm: 0475/67.55.37

BE17 1030 2051 0821 BIC NICABEBB

## MERLE NOIR



**FAMILLE** : Passereau appartenant à la famille des Turtidés.

**REPARTITION GEOGRAPHIQUE** : Présent partout en Europe. En Belgique il est principalement présent dans le centre du pays, un minimum en Flandre et dans les hautes fagnes. C'est un sédentaire, il migre seulement hors des régions à hiver rigoureux.

**DESCRIPTION** : Mâle et femelles ont un dimorphisme sexuel marqué : le mâle à le plumage noir et le bec jaune, la femelle (la merlette) à le plumage brun – gris à brun – foncé. Leur taille moyenne est de 25 cm.

**LONGEVITE** : N-C.

**HABITAT** : Il s'accommode à tous les biotopes, privilégiant principalement le milieu urbain, il vit en bonne relation avec l'homme. Ailleurs, il s'accommode des bosquets, parcs, jardins et bocages.

**REPRODUCTION** : le merle produit 2 à 3 pontes de 4 à 6 œufs verts une fois par an. Le début des amours se situe en mars. La couvaison dure 14 jours. Les jeunes sont indépendants à l'âge d'un mois. La mortalité est importante.

**ALIMENTATION** : le merle est omnivore, il se nourrit de baies, insectes, mollusques, vers, mie de pains, ...

**PREDATEURS** : le principale prédateur à l'heure actuelle est le chat, les rapaces et les corneilles noirs, les mustélidés (martres, fouines) font partie des prédateurs principaux, le hérisson et le blaireau sont des prédateurs opportunistes en s'attaquant aux œufs ou aux oisillons tombés du nid.

**DIVERS** : la population est estimée en 2001 à 540.000 couples nicheurs, cependant la population globale est en constante diminution. La prédation par les chats Errants est l'hypothèse la plus couramment avancée.