



Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
AGRÉÉ PAR LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
DÉPARTEMENT DE LA NATURE ET DES FORÊTS

Rue du Bourrelhier 21 - B-7050 Masnuy-St-Jean
www.closdelolivier.be - mail@closdelolivier.be

Tél.: 065/235975 - Gsm: 0475/67.55.37

BE17 1030 2051 0821 BIC NICABEBB

LE PIGEON RAMIER OU PALOMBE COMME DIT EN FRANCE



Fréquemment observé dans les parcs et les jardins, le ramier est plus farouche que le biset et s'envole à distance. De grandes troupes se forment à l'automne et en hiver. À la campagne, les agriculteurs considèrent le ramier comme un oiseau nuisible en hiver et au printemps car il fait des dégâts dans les champs de colza, de céréales et d'autres cultures (choux, trèfle, pois). Craintif en raison la chasse qui lui est faite comme oiseau gibier, le ramier est bien plus confiant en ville, où il marche sur les pelouses des parcs.

Ses goûts éclectiques en ce qui concerne la nourriture, le perchoir et le lieu de nidification lui permettent de s'adapter très rapidement.

Le ramier est un visiteur fréquent et familier des jardins, se nourrissant principalement à terre dans les pelouses, près des mangeoires, où il ramasse les graines ou les noisettes tombées. Au printemps, il lui arrive de fourrager dans le feuillage, où il se nourrit de bourgeons et de fleurs.

Leur bec fait office de paille. Les columbidés enfoncent le bec dans l'eau et aspirent, alors que les autres oiseaux le redressent à chaque gorgée pour avaler.

Les ramiers pondent à tout moment de l'année, ce qui entraîne la prolifération de l'espèce. Il construit son nid et couve même au milieu de l'hiver, bien que la période principale de couvaison reste de juin à septembre. Le ramier nourrit ses petits avec le « lait de pigeon », production du jabot riche en protéines et en graisse, ce qui lui permet de se reproduire en toutes saisons. La plupart des autres oiseaux des parcs et des jardins alimentent leurs petits avec des insectes saisonniers.

Son habitat est très répandu dans nos régions. Campagne ouverte de tout type, à condition d'être parsemée de quelques arbres.

PÉRIODE DE NIDIFICATION : avril à septembre.

NOMBRE DE COUVAISONS : deux à trois couvées, selon la quantité de nourriture disponible.

NOMBRE D'ŒUFS : 2 œufs blancs.

INCUBATION : 17 jours (2 sexes).

NID : Le pigeon ramier niche dans les rangées d'arbres de toutes les essences, dans les nids de corneille abandonnés et les nids d'écureuil, parfois à même sur le sol ou sur les rebords de bâtiments urbains. Le nid rudimentaire est composé de quelques

branches laissant deviner les œufs. Les matériaux sont cassés ou pris à terre. Les œufs sont visibles à travers le nid. Si celui-ci sert plusieurs fois, il devient volumineux.

TYPE DE NICHOIR : N'utilise pas les niochirs.

ENVOL : 20 à 35 jours.

ÉMANCIPATION : 42 jours environ.

TAUX_DE SURVIE : 64 %

MIGRATION : Migrateur hivernant en Belgique

Le pigeon ramier se nourrit de légumineuses comme pois, choux, colza, navets, rutabagas. Il mange également des glands, les fruits du sureau et de l'aubépine, des graines d'autres plantes sauvages, des vers et des insectes. En hiver, le ramier mange les baies de lierre. Il avale également des graviers : ceux-ci lui servent à broyer les aliments dans le gésier.

MANGEOIRES : Le pigeon ramier visite rarement les mangeoires où il prend cependant du pain, des graines et des épluchures de légumes. Il se nourrit souvent au sol, en dessous et sur les mangeoires, picorant les graines tombées à terre. On le voit plus souvent boire dans une petite pièce d'eau ou une baignoire pour oiseau.

ÉTAT DES POPULATIONS : Le pigeon ramier migrateur est menacé de disparition du fait de la chasse effrénée dont il fait l'objet en octobre.