



Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
CENTRE AGREE PAR LE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
MEMBRE DE LA L.R.B.PO

Rue du Bourrelier 21 B-7050 Masnuy-St-Jean

Tél.: 065/235975

www.closdelolivier.be

mail@closdelolivier.be

LE TROGLODYTE MIGNON



DESCRIPTION

Le troglodyte mignon mesure à peu près dix centimètres. Son corps rond est vêtu d'un plumage brunâtre et légèrement barré. Il a en outre un bec mince et très pointu. Ce petit oiseau est surmonté d'une petite queue, presque toujours dressée verticalement. De plus, il fait partie des oiseaux les plus petits d'Europe après le Roitelet. Son vol est rectiligne sur de courtes distances.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET HABITAT

Cette espèce vit en Europe, en Afrique du Nord, en Asie et en Amérique du Nord. Commun dans les forêts et les jardins à épais fourrés, le mâle construit plusieurs gros nids de mousse, en forme sphérique, à faible hauteur, dans le creux d'un arbre ou le trou d'un mur. À l'intérieur de l'un des nids, la femelle pond et couve ses œufs tandis que le mâle, lui, en occupe un autre.

COMPORTEMENT

Ce petit oiseau est essentiellement sédentaire.

REGIME ALIMENTAIRE

Majoritairement insectivore, le troglodyte se nourrit principalement d'insectes et d'invertébrés.

REPRODUCTION

Après l'accouplement, la femelle pond et couve seule cinq à sept œufs blancs tachetés de rouge. L'incubation dure de quatorze à seize jours. Les deux parents nourrissent leurs petits.