


Les principales anthropozoonoses

The background is a gradient of blue and black. A prominent curved line starts from the left edge and curves downwards towards the bottom right, separating the title area from the rest of the slide.

Les principales anthropozoonoses

Ou plutôt les principales maladies
animales transmissibles à l'homme en
Belgique.

La rage



La rage

Le grand classique aujourd'hui éteint.

La rage

- Pays exempt (dernier cas en 1998 au sud Luxembourg)
- Risque principal à l'Est et dans les pays d'Afrique.
- Obligation légale de vacciner les chiens.
 - Sud du sillon sambre et meuse
 - Pays européens (France validité 1 an)

La rage

- Attention : législation entre pays très variée (spécialement pour les pays du commonwealth)
- Belgique : un risque de retour?

Les morsures et griffures de chat



Les morsures et griffures de chats

Jamais Bénin

Morsures de chat

- Flore buccale très variée.
- Toujours désinfecter les blessures bénignes
- Attention aux morsures profondes ; risques de lymphangiectasie réels ; bien désinfecter et bien surveiller.
- Si la plaie dégénère, contacter le médecin en urgence.

Morsures de chat



Griffe de chat.

- Phénomènes allergéniques
- Certains animaux sont porteurs de *Bartonella henselae*.
- Au bout de 3 à 4 jours ; les ganglions lymphatiques gonflent ; de la fièvre apparaît.
- Traitement aux antibiotiques.

Ecchinococose

Verminose contagieuse



Ecchinococose

- *Echinococcus multilocularis*.
- Verminose du colon des renards.
- Cycle complexe – hôte définitif – hôte intermédiaire
- Chiens et chats peuvent être porteurs.
- Hôtes intermédiaires diverses : rongeurs, lagomorphes, chevaux, humains...

COMMENT SE DEVELOPPE LE CESTODE DU RENARD.

Le cycle biologique de
Echinococcus multilocularis




Ecchinococose

- Fréquence de la maladie chez le renard.
 - 50% en ardenne.
 - 17% en hainaut.
 - 2% en flandre.
- Risque pour l'humain
 - hépatite – cyrrhose – cancer parasitaire.

Ecchinococose

- Nettoyer les aliments venant du jardin
- Le mieux est de cuire (chaleur tue les œufs)
- Vermifuger les chiens.
 - Spécialement les chiens de chasse, tous les mois.
- La manipulation des renards doit se pratiquer avec des gants.

Maladies transmises par les tiques

A decorative graphic element consisting of a blue gradient shape that starts as a thin line on the left and curves downwards and to the right, ending as a solid blue area at the bottom right corner of the slide.

Maladies transmises par les tiques

- Ixodès – Dermatocentor – Rhipicephalus.
- Transmission de la borréliose (maladie de Lyme).
- Transmission de la piroplasmose (chien) et l'ehrlichiose (chien et chat)
- Étendue : Belgique – France – Méditerranée.
- Localisation des tiques : broussailles d'avril à octobre. Une tique sur 5 est porteuse de borrelia.

Maladies transmises par les tiques

- La tique transmet la maladie en approximativement 24 à 48h de présence sur la peau.
- Enlever la tique à l'aide d'une pince à épiler. Tourner la tique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ensuite tirer. (la rotation provoque la rétraction des crochets)

Maladies transmises par les tiques

- N'oubliez pas de traiter les animaux de compagnie (chiens et chats)
- Colliers – sprays – spot on.
- Privilégiez les produits spécifiques vétérinaires aux produits du commerce.



La Tularémie



La tularémie

- Maladie transmise essentiellement par les lièvres.
- Maladie des chasseurs
- Dépecer les animaux à l'aide de gants!
- Érythème et abcès cutanés
- Traitement curatif aux antibiotiques.

La trichinose



La trichinose

- Maladie parasitaire du porc, du sanglier, parfois du cheval (contaminations les plus fréquentes)
- Cycle via rongeurs et grands animaux, l'humain prend la place du rongeur dans le cycle
- Bien cuire les viandes à cœur (52°) ; les viandes de porcs doivent être blanches.

L'hantavirose



L'hantavirose

- Maladie virale des rongeurs.
- Transmission aérogène du virus à l'être humain.
- Progression cyclique en Belgique (pic tous les trois ans)
- Grippe avec complications rénales.
- Mettre un masque pour nettoyer les remises!

Les maladies diverses de la faune



Maladies diverses de la faune

- Tuberculose – charbon bactérien
- Yersiniose – listériose - salmonellose
- Pasteurellose – rouget – chlamydiose (pigeons)
- Brucellose – leptospirose (maladie des rats).
- Quelques exemples parmi tant d'autres

Les maladies diverses de la faune

- Normalement toutes les viandes de boucherie sont contrôlées par l'afsca ; y compris les viandes issues du gibier.
- Le risque est plus grand pour des animaux issus directement de la chasse sans intermédiaire car peu de contrôles à l'heure actuelle.


Les maladies diverses de la faune

- De manière générale : ne pas manger des animaux qui paraissent amaigris ou dont la viande paraît décolorée.
- Si possible examiner le foie de l'animal.
- (le chasseur est responsable de la viande qu'il vend de particulier à particulier)

Les maladies diverses de la faune



Les maladies diverses de la faune



Grippe aviaire (peste aviaire)



Grippe aviaire (peste aviaire)

Serons-nous tous morts demain?

Grippe aviaire (peste aviaire)

Non bien sûr!

Grippe aviaire (peste aviaire)

- Maladie virale (paramyxovirus)
- Proche du virus de la grippe humaine (cousin).
- Le risque provient de la « cassure génétique »
 - Le H5N1 aviaire se recombinerait avec le virus de la grippe classique dans un organisme humain

Grippe Aviaire (peste aviaire)

- Situation au 12 février 2006
 - Cas en Turquie et à l'est de la Grèce ; premier cas en Italie, en bulgarie.
 - Cas au Kenya et au Nigéria.
 - Cas humains cantonnés à l'est de la Turquie
 - 1 cas en Angleterre sur un perroquet importé illégalement

Grippe Aviaire (peste aviaire)

- Risques de transmission en Belgique
 - Par les migrations d'oiseaux
 - Par les imports illégaux d'oiseaux sur le pays.
 - À l'heure actuelle les frontières sont fermées aux imports d'oiseaux.
 - Les volailles sont autorisées à sortir.
 - Les concentrations d'oiseaux d'ornements sont autorisées

Grippe Aviaire (peste aviaire)

- Le passage à l'homme se produira probablement (1 jour – 1 an ?)
- Pour l'instant : maladie « d'immunodéprimé »
- Pas de panique.
 - Stocks d'antiviraux.
 - Soins intensifs nettements plus performants qu'en 1917.
 - Fabrication de vaccins.

Grippe aviaire (peste aviaire)

- Je trouve un oiseau mort que dois-je faire?
 - Dépend du type d'oiseaux.
 - Prevenir les autorités si on trouve :
 - 1 oiseau remarquable mort (buse, cygne, ...)
 - 5 anatidés près d'un cours d'eau (oie, canard)
 - + de 10% de mortalité en élevage avicole.
 - Une 20aine de petits passereaux
 - Pour tous renseignements : contactez le vétérinaire

Grippe aviaire (peste aviaire)

- www.Afsca.be
- www.influenza.be