



Clos de l'Olivier a.s.b.l

CENTRE DE REVALIDATION DE LA FAUNE SAUVAGE
CENTRE AGREE PAR LE MINISTRE DE LA REGION WALLONNE
MEMBRE DE LA L.R.B.PO

Rue du Bourrelrier 21 B-7050 Masnuy-St-Jean

Tél.: 065/235975

www.closdelolivier.be

mail@closdelolivier.be

LA PROTECTION DES PETITS OISEAUX.

De début avril à mi-septembre, les oiseaux sont en pleine période de reproduction. Les oiseaux des jardins nichent dans les arbres, les murs et les haies des riverains.

Ils se nourrissent dans les jardins et dans les pelouses de graminées mais aussi et surtout d'insectes. Chaque couple quelque espèce que ce soit tente de produire une moyenne de 6 jeunes deux à trois fois courant de l'année.

Leurs principaux prédateurs en ville sont les chats, les pies et les corneilles.

Quelques conseils pour bien les accueillir.

Conseil numéro 1.

Tout d'abord, il faut éviter de tailler nos haies durant la période de nidification soit de début avril à mi septembre. Il en sera de même pour les arbres qui ne seront pas coupés.

Si malgré tout il n'y a pas de possibilités de laisser l'arbre ou la haie en l'état, une petite surveillance des allées et venues des oiseaux du jardin fourniront des indications essentielles sur l'emplacement des nids. Le recul de quelques jours des travaux va pouvoir permettre aux jeunes de reprendre leur envol. On pourra tailler la haie entre deux nidifications.

Si le nid est mis à jour par la taille de la haie, les oisillons seront condamnés car ils seront une proie facile pour leurs prédateurs.

Conseil numéro 2.

Puisque les oiseaux sont des insectivores spécialement dans les premiers jours du nourrissage des oisillons (les insectes sont riches en protéines), **on veillera à ne pas empoisonner les insectes de son jardin!** Même en faible dose, les toxiques utilisés au jardin pour empêcher les limaces et autres insectes de venir manger les plantes se concentreront dans les oisillons et **risqueront de les empoisonner.**



Important! Utilisez toujours ce type de produit dans les limites de la notices! Il faut en général très peu de produit pour agir et toute sur utilisation mettra en danger vos oiseaux.

Par exemple, une moyenne de trois grains anti limace par plant protégera de manière convenable le légume des ravages. Il est donc totalement inutile de mettre toute la boîte sur un petit jardin.

Si vous avez des ravageur dans le jardin, privilégiez au contraire l'apparition de leur insectes prédateurs naturels qui serviront eux même de nourriture pour les oiseaux.

Conseil numéro 3.

Les chats sont présents en grande quantités dans nos villes. Ils ont parfois un maître et parfois ils sont orphelins (chat harets). Ce sont de grands pourvoyeurs de dégâts dans la faune. **C'est la seconde cause d'entrée de petits oiseaux dans notre centre après la taille des haies!**

Un geste simple est de réguler les populations de chat par la stérilisation des mâles et des femelles. Il est important de procéder de même pour les chats harets du voisinage en alertant les autorités communales de leur présence.

Pour les animaux ayant un maître. L'ajout au collier d'une petite clochette autour du cou permettra aux oiseaux d'entendre l'approche du prédateur et de pouvoir s'enfuir.

Conseil numéro 4.

Les corneilles et les pies sont des prédateurs dérégulés. La courbe de leur jeunes ne suit plus la courbe des jeunes de leurs proies car ils trouvent dans nos poubelles des grosses quantités de nourritures qui leur fournit une énergie suffisante pour produire énormément de jeunes.

Prédateurs opportunistes, leur surpopulation en certains lieux entraîne une dévastation systématique des nids.

La régulation "en aval" (la destruction) n'as pas réellement de sens si il n'y a par une régulation "en amont" aussi il faut protéger ses poubelles et limiter ainsi l'accès à de la nourriture facile. Privé d'énergie, le taux de jeune chutera et les populations se réguleront naturellement.

Conseil numéro 5.

Il faut éviter de nourrir toute l'année les oiseaux.

Si, en période hivernale, il est intéressant de protéger les oiseaux en fournissant de la nourriture, en été, il y a suffisamment d'aliments dans la nature pour eux.

En nourrissant toute l'année, vous les habituerez à la facilité et ils seront devenus incapables de se nourrir de manière correcte en votre absence.

En outre, vous créez avec le nourrissage des zones de concentration en oiseaux et de conflits qui sont propices au développement de maladies épidémiques. Vous risquez donc de voir toute la population de petits oiseaux se décimer rapidement à cause d'un agent pathogène présent à la mangeoire.

Quelques sites intéressants pour vous aider à protéger les oiseaux.

www.aves.be

www.adalia.be

www.creaves.be